

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率^{2b}排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁴）（每十萬人口），民國一百一十年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	15,448	130.95 ^{5a}	76.15 ^{5a}	82.51 ^{5a}
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,880	72.21	35.33	39.74
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,238	69.47	33.98	38.42
4	C61	攝護腺(前列腺)	7,481	64.61 ^{5b}	29.70 ^{5b}	35.31 ^{5b}
5	C22	肝及肝內膽管	10,775	46.10	22.16	25.04
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,211	35.13	20.03	21.55
		口腔	5,319	22.75	13.04	14.11
		口咽	1,708	7.31	4.16	4.44
		下咽	1,184	5.07	2.83	3.01
7	C54	子宮體	3,181	26.97 ^{5a}	15.75 ^{5a}	17.01 ^{5a}
8	C73	甲狀腺	4,626	19.79	13.55	14.71
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,793	15.20 ^{5a}	9.45 ^{5a}	10.20 ^{5a}
10	C16	胃	4,060	17.37	8.14	9.31
C00-C80 全癌症			121,762	520.90	275.90	306.46

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁴）（每十萬人口），民國一百一十年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,297	80.29	41.76	47.09
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,961	77.39	39.09	44.54
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,387	63.80	37.62	40.38
		口腔	4,694	40.54	24.12	26.01
		口咽	1,541	13.31	7.80	8.30
		下咽	1,152	9.95	5.70	6.06
4	C22	肝及肝內膽管	7,448	64.33	33.61	37.59
5	C61	攝護腺(前列腺)	7,481	64.61	29.70	35.31
6	C15	食道	2,614	22.58	12.80	13.72
7	C16	胃	2,413	20.84	10.30	11.80
8	C44	皮膚	2,127	18.37	8.67	10.32
9	C91-C95	白血病	1,588	13.71	9.48	10.02
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,727	14.92	8.37	9.36
C00-C80 全癌症			63,723	550.35	295.47	330.75

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁴）（每十萬人口），民國一百一十年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ^{2a}	年齡標準化 發生率 ^{2b}
1	C50	女性乳房	15,448	130.95	76.15	82.51
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,919	67.13	32.32	35.96
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,941	58.84	26.96	30.67
4	C73	甲狀腺	3,497	29.64	20.38	22.14
5	C54	子宮體	3,181	26.97	15.75	17.01
6	C22	肝及肝內膽管	3,327	28.20	11.63	13.60
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,793	15.20	9.45	10.20
8	C44	皮膚	1,827	15.49	6.11	7.25
9	C16	胃	1,647	13.96	6.27	7.19
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,438	12.19	6.41	7.09
C00-C80 全癌症			58,039	492.00	261.05	288.36

註： 1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。。惡性淋巴瘤：ICD-0-3 M-CODE 請見p. 496 附錄五。
 2. 年齡標準化率^{2a}係使用1976年世界標準人口為標準人口。年齡標準化率^{2b}係使用2000年世界標準人口為標準人口。
 3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括ICD-0-3 & ICD-10：C00-C06、C09-C10、C12-14。細分類代碼請見p. 498 附錄七。
 4. 原位癌：組織形態之分類碼第5碼（性態譯碼）為2；口腔、口咽及下咽與結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High
 5. ^{5a}：每10萬女性人口發生率及死亡率；^{5b}：每10萬男性人口發生率及死亡率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）

十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	15,259	128.36 (1)	75.83	82.10
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,829	71.43	35.85	40.52
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,370	69.48	34.76	39.09
4	C61	攝護腺	7,178	61.49 (2)	29.34	34.89
5	C22	肝及肝內膽管	10,982	46.61	23.08	26.14
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,277	35.13	20.27	21.79
7	C54	子宮體	3,032	25.51 (1)	15.11	16.30
8	C73	甲狀腺	4,932	20.93	14.45	15.70
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,824	15.34 (1)	9.95	10.66
10	C16	胃	4,257	18.07	8.65	9.90
	C00-C80	全癌症	121,979	517.71	280.00	311.34

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,477	81.18	43.12	48.60
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,877	76.04	39.16	44.66
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,474	64.02	38.14	40.94
4	C22	肝及肝內膽管	7,617	65.25	34.96	39.11
5	C61	攝護腺	7,178	61.49	29.34	34.89
6	C15	食道	2,668	22.85	13.29	14.20
7	C16	胃	2,464	21.11	10.70	12.26
8	C44	皮膚	2,324	19.91	9.60	11.45
9	C91-C95	白血病	1,549	13.27	9.40	9.87
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,719	14.73	8.53	9.52
	C00-C80	全癌症	63,893	547.32	300.04	336.19

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	15,259	128.36	75.83	82.10
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,493	63.03	31.19	34.64
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,352	61.85	29.31	33.33
4	C73	甲狀腺	3,715	31.25	21.61	23.46
5	C54	子宮體	3,032	25.51	15.11	16.30
6	C22	肝及肝內膽管	3,365	28.31	12.16	14.30
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,824	15.34	9.95	10.66
8	C16	胃	1,793	15.08	6.87	7.88
9	C44	皮膚	1,908	16.05	6.58	7.83
10	C53	子宮頸	1,436	12.08	7.00	7.78
	C00-C80	全癌症	58,086	488.63	264.76	292.75

註：1. 自96年癌症登記報告起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自106年起血液腫瘤採WHO2017年版分類標準暨2018年台灣編修版新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	14,856	124.86 (1)	74.84	80.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	17,302	73.30	38.09	42.94
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	16,233	68.77	35.37	39.77
4	C61	攝護腺	7,115	60.79 (2)	30.22	35.83
5	C22	肝及肝內膽管	11,272	47.76	24.62	27.66
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,204	34.76	20.61	22.14
7	C54	子宮體	3,124	26.26 (1)	15.81	17.00
8	C73	甲狀腺	4,850	20.55	14.25	15.46
9	C44	皮膚	4,442	18.82	8.47	10.14
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,677	14.09 (1)	9.16	9.86
	C00-C80	全癌症	121,254	513.72	284.28	315.86

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,893	84.52	46.40	52.26
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,847	75.58	40.09	45.61
3	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,468	63.80	38.95	41.82
4	C22	肝及肝內膽管	7,757	66.27	36.89	40.95
5	C61	攝護腺	7,115	60.79	30.22	35.83
6	C15	食道	2,639	22.55	13.18	14.18
7	C16	胃	2,389	20.41	10.56	12.14
8	C44	皮膚	2,356	20.13	9.85	11.81
9	C91-C95	白血病	1,529	13.06	9.13	9.70
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,602	13.69	8.09	9.05
	C00-C80	全癌症	64,109	547.70	308.57	345.37

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	14,856	124.86	74.84	80.99
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,386	62.08	31.46	35.01
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,409	62.27	30.58	34.61
4	C73	甲狀腺	3,582	30.11	20.94	22.70
5	C54	子宮體	3,124	26.26	15.81	17.00
6	C22	肝及肝內膽管	3,515	29.54	13.28	15.44
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,677	14.09	9.16	9.86
8	C44	皮膚	2,086	17.53	7.27	8.72
9	C53	子宮頸	1,393	11.71	6.88	7.67
10	C16	胃	1,549	13.02	6.11	7.04
	C00-C80	全癌症	57,145	480.29	264.80	292.66

註：1. 自96年癌症登記報告起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自106年起血液腫瘤採WHO2017年版分類標準暨2018年台灣編修版新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	14,217	119.71 (1)	72.97	78.86
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,525	70.05	36.97	41.84
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	15,345	65.05	34.39	38.75
4	C61	攝護腺	6,644	56.72 (2)	29.34	34.69
5	C22	肝及肝內膽管	11,342	48.08	25.45	28.63
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	8,170	34.63	20.87	22.45
7	C54	子宮體	2,787	23.47 (1)	14.37	15.48
8	C73	甲狀腺	4,445	18.84	13.15	14.27
9	C44	皮膚	4,049	17.16	8.04	9.60
10	C16	胃	3,798	16.10	8.12	9.29
	C00-C80	全癌症	116,131	492.31	278.79	309.84

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,512	81.21	45.27	51.17
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,424	71.92	39.31	44.88
3	C22	肝及肝內膽管	7,819	66.76	38.03	42.33
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,400	63.18	39.22	42.15
5	C61	攝護腺	6,644	56.72	29.34	34.69
6	C15	食道	2,579	22.02	13.23	14.25
7	C16	胃	2,334	19.93	10.65	12.18
8	C44	皮膚	2,153	18.38	9.30	11.16
9	C91-C95	白血病	1,455	12.42	9.06	9.63
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,512	12.91	7.74	8.64
	C00-C80	全癌症	61,779	527.44	304.75	341.30

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	14,217	119.71	72.97	78.86
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,921	58.28	30.26	33.69
3	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,013	59.05	29.50	33.55
4	C73	甲狀腺	3,302	27.80	19.38	21.01
5	C22	肝及肝內膽管	3,523	29.66	13.79	16.02
6	C54	子宮體	2,787	23.47	14.37	15.48
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,557	13.11	8.57	9.25
8	C44	皮膚	1,896	15.96	6.93	8.27
9	C53	子宮頸	1,433	12.07	7.06	7.85
10	C16	胃	1,464	12.33	5.88	6.76
	C00-C80	全癌症	54,352	457.66	257.60	284.66

註：1. 自96年癌症登記報告起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自106年起血液腫瘤採WHO2017年版分類標準暨2018年台灣編修版新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	13,965	117.83 (1)	73.11	78.88
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	16,408	69.61	37.9	42.93
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	14,282	60.59	32.65	36.97
4	C61	攝護腺	5,866	50.05 (2)	26.64	31.65
5	C22	肝及肝內膽管	11,225	47.62	26.02	29.3
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,797	33.08	20.4	21.98
7	C54	子宮體	2,695	22.74 (1)	14.03	15.11
8	C73	甲狀腺	4,053	17.19	12.06	13.09
9	C44	皮膚	3,804	16.14	8.02	9.49
10	C16	胃	3,703	15.71	8.15	9.39
	C00-C80	全癌症	111,684	473.81	274.52	305.38

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,434	80.5	46.15	52.21
2	C22	肝及肝內膽管	7,800	66.56	39.08	43.48
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,936	67.72	37.86	43.46
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,058	60.22	38.27	41.15
5	C61	攝護腺	5,866	50.05	26.64	31.65
6	C15	食道	2,563	21.87	13.47	14.5
7	C16	胃	2,304	19.66	10.74	12.4
8	C44	皮膚	2,089	17.82	9.44	11.31
9	C67	膀胱	1,707	14.57	7.78	9.11
10	C91-C95	白血病	1,383	11.8	8.4	8.98
	C00-C80	全癌症	59,297	505.97	299.21	335.71

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	13,965	117.83	73.11	78.88
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,974	58.84	30.46	34.66
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,346	53.55	28.22	31.56
4	C73	甲狀腺	3,118	26.31	18.42	19.96
5	C22	肝及肝內膽管	3,425	28.9	13.86	16.17
6	C54	子宮體	2,695	22.74	14.03	15.11
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,521	12.83	8.54	9.19
8	C44	皮膚	1,715	14.47	6.78	7.94
9	C53	子宮頸	1,418	11.96	7.1	7.88
10	C16	胃	1,399	11.8	5.86	6.76
	C00-C80	全癌症	52,387	442.02	254.3	280.96

註：1. 自96年癌症登記報告起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自106年起血液腫瘤採WHO2017年版分類標準暨2018年台灣編修版新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零五年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	12,672	107.20 (1)	67.60	72.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	15,374	65.31	36.43	41.29
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	13,488	57.30	31.81	35.99
4	C61	攝護腺	5,360	45.74 (2)	25.30	30.05
5	C22	肝及肝內膽管	11,075	47.05	26.57	29.90
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,805	33.16	20.88	22.48
7	C54	子宮體	2,462	20.83 (1)	12.99	14.00
8	C73	甲狀腺	3,679	15.63	11.05	12.01
9	C16	胃	3,658	15.54	8.22	9.46
10	C44	皮膚	3,627	15.41	7.81	9.27
	C00-C80	全癌症	105,832	449.59	266.56	296.72

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,706	74.29	43.66	49.34
2	C22	肝及肝內膽管	7,680	65.53	39.56	44.04
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,661	65.37	37.62	43.23
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	7,144	60.96	39.48	42.43
5	C61	攝護腺	5,360	45.74	25.30	30.05
6	C15	食道	2,431	20.74	13.03	14.07
7	C16	胃	2,306	19.68	10.94	12.63
8	C44	皮膚	1,982	16.91	9.16	10.91
9	C67	膀胱	1,600	13.65	7.56	8.80
10	C91-C95	白血病	1,252	10.68	7.93	8.45
	C00-C80	全癌症	56,854	485.13	294.30	330.03

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零五年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	12,672	107.20	67.60	72.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,668	56.41	29.88	34.06
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,827	49.30	26.85	29.89
4	C73	甲狀腺	2,780	23.52	16.68	18.06
5	C22	肝及肝內膽管	3,395	28.72	14.46	16.78
6	C54	子宮體	2,462	20.83	12.99	14.00
7	C56, C57.0- C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,507	12.75	8.53	9.18
8	C53	子宮頸	1,432	12.11	7.33	8.13
9	C44	皮膚	1,645	13.92	6.60	7.83
10	C16	胃	1,352	11.44	5.79	6.67
	C00-C80	全癌症	48,978	414.35	243.20	269.05

註：1. 自96年癌症登記報告起，淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門原位癌包含High grade dysplasia
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	12,360	104.92 (1)	67.51	72.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	15,579	66.32	37.82	43.01
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	13,086	55.70	31.35	35.73
4	C22	肝及肝內膽管	11,420	48.61	28.28	31.79
5	C61	攝護腺	5,106	43.60 (2)	24.93	29.42
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	7,628	32.47	20.88	22.49
7	C54	子宮體	2,440	20.71 (1)	13.09	14.14
8	C73	甲狀腺	3,618	15.40	10.98	11.94
9	C16	胃	3,849	16.38	8.92	10.28
10	C44 ⁵	皮膚	3,799	16.17	8.41	10.04
	C00-C80	全癌症	105,156	447.62	270.85	302.03

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,968	76.57	45.95	52.14
2	C22	肝及肝內膽管	7,884	67.32	41.71	46.48
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,660	65.40	38.23	44.16
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,965	59.47	39.32	42.29
5	C61	攝護腺	5,106	43.60	24.93	29.42
6	C15	食道	2,415	20.62	13.19	14.23
7	C16	胃	2,351	20.07	11.38	13.23
8	C44 ⁵	皮膚	2,044	17.45	9.70	11.60
9	NHL	非何杰金氏淋巴瘤	1,425	12.17	7.90	8.78
10	C67	膀胱	1,510	12.89	7.27	8.51
	C00-C80	全癌症	56,642	483.62	299.51	336.47

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	12,360	104.92	67.51	72.99
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,611	56.12	30.49	34.85
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,426	46.06	25.34	28.45
4	C22	肝及肝內膽管	3,536	30.02	15.73	18.15
5	C73	甲狀腺	2,729	23.17	16.46	17.87
6	C54	子宮體	2,440	20.71	13.09	14.14
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,434	12.17	8.31	8.96
8	C44 ⁵	皮膚	1,755	14.90	7.26	8.67
9	C53	子宮頸	1,485	12.61	7.82	8.63
10	C16	胃	1,498	12.72	6.73	7.68
	C00-C80	全癌症	48,514	411.83	246.49	273.14

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	11,769	100.28 (1)	65.55	70.74
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	15,764	67.27	39.40	44.71
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	12,462	53.18	30.82	35.12
4	C22	肝及肝內膽管	11,358	48.47	29.29	32.74
5	C61	攝護腺	4,904	41.92 (2)	24.73	29.14
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	7,606	32.46	21.27	22.93
7	C54	子宮體	2,257	19.23 (1)	12.34	13.34
8	C73	甲狀腺	3,361	14.34	10.21	11.14
9	C16	胃	3,786	16.16	8.98	10.41
10	C44 ⁵	皮膚	3,674	15.68	8.50	10.10
	C00-C80	全癌症	103,147	440.16	272.52	303.83

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	9,006	76.99	47.47	53.86
2	C22	肝及肝內膽管	7,810	66.76	42.75	47.30
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,326	62.63	37.42	43.31
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,922	59.17	39.79	42.85
5	C61	攝護腺	4,904	41.92	24.73	29.14
6	C15	食道	2,448	20.93	13.62	14.75
7	C16	胃	2,328	19.90	11.49	13.34
8	C44 ⁵	皮膚	2,036	17.40	10.08	11.93
9	C67	膀胱	1,601	13.69	7.96	9.29
10	NHL	非何杰金氏淋巴瘤	1,387	11.86	7.76	8.69
	C00-C80	全癌症	56,093	479.51	304.16	341.40

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	11,769	100.28	65.55	70.74
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,758	57.58	32.07	36.47
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,136	43.76	25.02	27.99
4	C22	肝及肝內膽管	3,548	30.23	16.61	19.07
5	C73	甲狀腺	2,535	21.60	15.25	16.61
6	C54	子宮體	2,257	19.23	12.34	13.34
7	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,447	12.33	8.43	9.12
8	C53	子宮頸	1,452	12.37	7.67	8.50
9	C44 ⁵	皮膚	1,638	13.96	7.06	8.44
10	C16	胃	1,458	12.42	6.72	7.80
	C00-C80	全癌症	47,054	400.94	244.91	271.36

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	11,281	96.51 (1)	64.03	69.07
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	15,140	64.77	39.02	44.32
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	11,751	50.27	29.89	34.09
4	C22	肝及肝內膽管	11,424	48.88	30.56	34.06
5	C61	攝護腺	4,801	41.09 (2)	24.62	29.22
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	7,248	31.01	20.72	22.30
7	C54	子宮體	2,011	17.20 (1)	11.23	12.12
8	C16	胃	3,768	16.12	9.27	10.74
9	C73	甲狀腺	3,122	13.36	9.72	10.53
10	C44 ⁵	皮膚	3,655	15.64	8.66	10.26
	C00-C80	全癌症	99,143	424.17	269.21	299.73

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,681	74.29	46.85	53.19
2	C22	肝及肝內膽管	7,905	67.65	44.64	49.32
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,093	60.7	37.23	43.01
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,633	56.77	38.90	41.80
5	C61	攝護腺	4,801	41.09	24.62	29.22
6	C15	食道	2,348	20.09	13.39	14.49
7	C16	胃	2,422	20.73	12.26	14.32
8	C44 ⁵	皮膚	1,944	16.64	9.72	11.52
9	C67	膀胱	1,481	12.67	7.60	8.82
10	NHL	非何杰金氏淋巴瘤	1,316	11.26	7.56	8.42
	C00-C80	全癌症	54,601	467.29	303.39	340.08

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	11,281	96.51	64.03	69.07
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,459	55.26	31.9	36.3
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	4,658	39.85	23.31	26.16
4	C22	肝及肝內膽管	3,519	30.11	17.28	19.7
5	C73	甲狀腺	2,362	20.21	14.64	15.83
6	C54	子宮體	2,011	17.2	11.23	12.12
7	C53	子宮頸	1,579	13.51	8.5	9.46
8	C44 ⁵	皮膚	1,711	14.64	7.69	9.12
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,321	11.3	7.92	8.55
10	C16	胃	1,346	11.52	6.56	7.5
	C00-C80	全癌症	44,542	381.06	238.98	264.25

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零一年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	10,525	90.40 (1)	61.21	65.93
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	14,965	64.18	39.80	45.10
3	C22	肝及肝內膽管	11,422	48.99	31.39	35.02
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	11,692	50.15	30.56	34.99
5	C61	攝護腺	4,735	40.56 (2)	25.02	29.70
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	7,047	30.22	20.67	22.27
7	C54	子宮體	1,936	16.63 (1)	11.08	11.96
8	C16	胃	3,796	16.28	9.57	11.11
9	C73	甲狀腺	2,895	12.42	9.12	9.90
10	C44 ⁵	皮膚	3,274	14.04	8.16	9.65
	C00-C80	全癌症	96,694	414.71	269.06	300.01

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零一年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,558	73.31	47.49	53.67
2	C22	肝及肝內膽管	7,924	67.88	45.77	50.57
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,072	60.58	38.04	44.04
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,462	55.36	38.79	41.73
5	C61	攝護腺	4,735	40.56	25.02	29.70
6	C16	胃	2,387	20.45	12.49	14.54
7	C15	食道	2,194	18.79	12.77	13.84
8	C44 ⁵	皮膚	1,820	15.59	9.53	11.28
9	C67	膀胱	1,416	12.13	7.46	8.70
10	NHL	非何杰金氏淋巴瘤	1,269	10.87	7.46	8.33
	C00-C80	全癌症	53,553	458.76	304.02	341.38

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百零一年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	10,525	90.4	61.21	65.93
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,407	55.03	32.73	37.25
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	4,620	39.68	23.83	26.84
4	C22	肝及肝內膽管	3,498	30.05	17.79	20.33
5	C73	甲狀腺	2,236	19.21	14.07	15.25
6	C54	子宮體	1,936	16.63	11.08	11.96
7	C53	子宮頸	1,567	13.46	8.64	9.6
8	C44 ⁵	皮膚	1,454	12.49	6.92	8.18
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,236	10.62	7.47	8.04
10	C16	胃	1,409	12.1	6.9	8.01
	C00-C80	全癌症	43,141	370.55	237.98	263.29

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	10,056	86.85 (1)	59.57	64.28
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	14,087	60.65	38.59	43.77
3	C22	肝及肝內膽管	11,292	48.62	32.11	35.79
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	11,059	47.62	29.60	34.04
5	C61	攝護腺	4,628	39.74 (2)	24.89	29.66
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,890	29.67	20.60	22.24
7	C16	胃	3,824	16.47	10.00	11.60
8	C54	子宮體	1,722	14.87 (1)	10.07	10.86
9	C53	子宮頸	1,673	14.45 (1)	9.51	10.51
10	C44 ⁵	皮膚	2,985	12.85	7.54	8.96
	C00-C80	全癌症	92,682	399.06	264.29	295.12

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,140	69.9	46.56	52.59
2	C22	肝及肝內膽管	7,920	68.01	47.15	52.03
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,938	59.58	38	44.21
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,308	54.17	38.48	41.47
5	C61	攝護腺	4,628	39.74	24.89	29.66
6	C16	胃	2,430	20.87	13.07	15.23
7	C15	食道	2,063	17.71	12.34	13.32
8	C44 ⁵	皮膚	1,590	13.65	8.41	9.92
9	C67	膀胱	1,389	11.93	7.46	8.7
10	LEU	白血病	1,123	9.64	8.06	8.45
	C00-C80	全癌症	51,965	446.22	302.34	339.44

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國一百年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準 化發生率 ²	年齡標準 化發生率 ³
1	C50	女性乳房	10,056	86.85	59.57	64.28
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	5,947	51.36	31.24	35.65
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	4,121	35.59	21.99	24.79
4	C22	肝及肝內膽管	3,372	29.12	17.86	20.41
5	C73	甲狀腺	1,954	16.88	12.4	13.45
6	C54	子宮體	1,722	14.87	10.07	10.86
7	C53	子宮頸	1,673	14.45	9.51	10.51
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,240	10.71	7.69	8.28
9	C16	胃	1,394	12.04	7.18	8.26
10	C44 ⁵	皮膚	1,395	12.05	6.73	8.07
	C00-C80	全癌症	40,717	351.64	229.87	255.00

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，

3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	9,655	83.76 (1)	58.63	63.16
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	14,040	60.62	40.34	45.32
3	C22	肝及肝內膽管	11,023	47.59	32.41	36.07
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,615	45.83	29.10	33.61
5	C61	攝護腺	4,392	37.75 (2)	24.17	28.77
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,560	28.32	20.07	21.68
7	C16	胃	3,854	16.64	10.30	12.03
8	C54	子宮體	1,737	15.07 (1)	10.47	11.25
9	C53	子宮頸	1,680	14.57 (1)	9.74	10.81
10	C44 ⁵	皮膚	2,978	12.86	7.85	9.29
	C00-C80	全癌症	90,649	391.37	265.83	296.67

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	8,143	69.99	48.58	54.39
2	C22	肝及肝內膽管	7,751	66.62	47.52	52.34
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,697	57.56	37.49	43.68
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,028	51.81	37.62	40.56
5	C61	攝護腺	4,392	37.75	24.17	28.77
6	C16	胃	2,415	20.76	13.14	15.43
7	C15	食道	2,091	17.97	12.77	13.81
8	C44 ⁵	皮膚	1,575	13.54	8.62	10.20
9	C67	膀胱	1,427	12.26	7.88	9.24
10	C11	鼻咽	1,194	10.26	7.54	8.22
	C00-C80	全癌症	50,892	437.4	303.57	340.66

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十九年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	9,655	83.76	58.63	63.16
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	5,897	51.16	32.65	36.84
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,918	33.99	21.38	24.27
4	C22	肝及肝內膽管	3,272	28.39	18.00	20.54
5	C73	甲狀腺	1,838	15.95	11.96	12.91
6	C54	子宮體	1,737	15.07	10.47	11.25
7	C53	子宮頸	1,680	14.57	9.74	10.81
8	C16	胃	1,439	12.48	7.66	8.85
9	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,245	10.80	7.83	8.46
10	C44 ⁵	皮膚	1,403	12.17	7.13	8.44
	C00-C80	全癌症	39,757	344.91	231.31	256.23

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。自99年起血液腫瘤採WHO2008年版分類標準2010年台灣編修新分類呈現，詳細分類代碼請見癌症登記報告附錄五。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，
3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。
4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	8,926	77.73 (1)	55.44	59.91
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	12,488	54.01	36.34	41.35
3	C22	肝及肝內膽管	11,080	47.92	33.58	37.31
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	10,643	46.03	30.19	34.81
5	C61	攝護腺	4,013	34.49 (2)	22.60	26.89
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	6,480	28.03	20.37	21.98
7	C16	胃	3,848	16.64	10.67	12.42
8	C53	子宮頸	1,796	15.64 (1)	10.73	11.87
9	C54	子宮體	1,496	13.03 (1)	9.20	9.92
10	C44 ⁵	皮膚	2,928	12.66	8.10	9.49
	C00-C80	全癌症	87,189	377.12	262.53	293.38

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C22	肝及肝內膽管	7,747	66.57	48.68	53.60
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	7,151	61.45	42.86	48.65
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,737	57.89	38.75	45.08
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	5,927	50.93	37.95	40.83
5	C61	攝護腺	4,013	34.49	22.6	26.89
6	C16	胃	2,404	20.66	13.57	15.86
7	C15	食道	1,898	16.31	11.94	12.97
8	C44 ⁵	皮膚	1,589	13.66	9.17	10.65
9	C67	膀胱	1,419	12.19	8.07	9.42
10	M959-976	非何杰金氏淋巴瘤	1,205	10.36	7.64	8.47
	C00-C80	全癌症	49,022	421.27	299.56	336.25

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十八年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	8,926	77.73	55.44	59.91
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	5,337	46.48	30.25	34.48
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,906	34.02	22.22	25.16
4	C22	肝及肝內膽管	3,333	29.03	19.13	21.69
5	C73	甲狀腺	1,846	16.08	12.14	13.17
6	C53	子宮頸	1,796	15.64	10.73	11.87
7	C54	子宮體	1,496	13.03	9.20	9.92
8	C16	胃	1,444	12.58	7.95	9.18
9	C44 ⁵	皮膚	1,339	11.66	7.08	8.38
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,113	9.69	7.12	7.70
	C00-C80	全癌症	38,167	332.38	228.35	253.49

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，

3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。

7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	8,136	71.30 (1)	51.95	56.07
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	11,004	47.77	32.93	37.55
3	C22	肝及肝內膽管	10,565	45.86	33.23	36.82
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,516	41.31	27.93	32.21
5	C61	攝護腺	3,603	30.99 (2)	20.46	24.55
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	5,781	25.09	18.57	20.06
7	C16	胃	3,578	15.53	10.24	11.94
8	C53	子宮頸	1,725	15.12 (1)	10.71	11.78
9	C54	子宮體	1,424	12.48 (1)	9.02	9.75
10	C44 ⁵	皮膚	2,585	11.22	7.33	8.63
	C00-C80	全癌症	79,818	346.48	247.39	276.46

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C22	肝及肝內膽管	7,401	63.66	47.81	52.57
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,277	53.99	38.73	43.93
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	6,194	53.28	36.66	42.60
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	5,349	46.01	34.84	37.57
5	C61	攝護腺	3,603	30.99	20.46	24.55
6	C16	胃	2,303	19.81	13.18	15.52
7	C15	食道	1,849	15.90	11.92	12.90
8	C67	膀胱	1,476	12.70	8.93	10.25
9	C44 ⁵	皮膚	1,380	11.87	7.99	9.38
10	C11	鼻咽	1,162	9.99	7.63	8.29
	C00-C80	全癌症	45,171	388.52	282.46	317.26

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十七年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	8,136	71.30	51.95	56.07
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	4,727	41.43	27.51	31.54
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,322	29.11	19.71	22.29
4	C22	肝及肝內膽管	3,164	27.73	19.16	21.57
5	C53	子宮頸	1,725	15.12	10.71	11.78
6	C73	甲狀腺	1,561	13.68	10.50	11.37
7	C54	子宮體	1,424	12.48	9.02	9.75
8	C16	胃	1,275	11.17	7.41	8.47
9	C44 ⁵	皮膚	1,205	10.56	6.68	7.89
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,110	9.73	7.18	7.79
	C00-C80	全癌症	34,647	303.64	214.54	237.80

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，

3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。

7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率³排序）
 十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	7,502	66.10 (1)	49.28	53.09
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	10,511	45.78	32.73	37.09
3	C22	肝及肝內膽管	10,110	44.04	33.00	36.37
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	9,059	39.46	27.41	31.63
5	C61	攝護腺	3,367	29.00 (2)	19.63	23.50
6	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	5,458	23.77	18.01	19.46
7	C16	胃	3,612	15.73	10.70	12.47
8	C53	子宮頸	1,749	15.41 (1)	11.06	12.23
9	C44 ⁵	皮膚	2,427	10.57	7.24	8.44
10	C54	子宮體	1,165	10.26 (1)	7.67	8.26
	C00-C80	全癌症	75,769	330.03	241.99	270.07

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C22	肝及肝內膽管	7,210	62.11	48.33	52.77
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	6,040	52.03	38.44	43.41
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,898	50.81	35.88	41.61
4	C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽	5,006	43.12	33.46	36.02
5	C61	攝護腺	3,367	29	19.63	23.50
6	C16	胃	2,311	19.91	13.89	16.18
7	C15	食道	1,685	14.51	11.16	12.10
8	C67	膀胱	1,457	12.55	8.84	10.25
9	C44 ⁵	皮膚	1,314	11.32	8.05	9.30
10	C11	鼻咽	1,167	10.05	7.74	8.41
	C00-C80	全癌症	43,330	373.25	278.71	312.09

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十六年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生率	年齡標準化 發生率 ²	年齡標準化 發生率 ³
1	C50	女性乳房	7,502	66.10	49.28	53.09
2	C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	4,471	39.39	27.32	31.05
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	3,161	27.85	19.30	21.94
4	C22	肝及肝內膽管	2,900	25.55	18.20	20.47
5	C53	子宮頸	1,749	15.41	11.06	12.23
6	C73	甲狀腺	1,407	12.40	9.56	10.40
7	C16	胃	1,301	11.46	7.63	8.87
8	C54	子宮體	1,165	10.26	7.67	8.26
9	C44 ⁵	皮膚	1,113	9.81	6.48	7.63
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,047	9.23	7.01	7.61
	C00-C80	全癌症	32,439	285.82	207.19	229.74

註：1. 自96年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 年齡標準化率²係使用1976年世界標準人口為標準人口，

3. 年齡標準化率³係使用2000年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。

7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率²排序）

十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十五年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,895	61.10 (1)	46.29	49.99
2	C22	肝及肝內膽管	10,092	44.12	33.97	37.44
3	C18-C21	結腸及直腸	10,248	44.80	33.01	37.35
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,748	38.24	27.20	31.44
5	C61	攝護腺	3,073	26.51 (2)	18.40	21.94
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	5,352	23.40	18.07	19.55
7	C16	胃	3,794	16.58	11.71	13.57
8	C53	子宮頸	1,828	16.20 (1)	11.89	13.18
9	C44 ⁴	皮膚	2,457	10.74	7.66	8.88
10	C54	子宮體	1,159	10.27 (1)	7.87	8.45
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,822	7.96	6.20	6.85
	C00-C80	全癌症	73,293	320.39	240.90	268.76

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十五年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C22	肝及肝內膽管	7,167	61.83	49.08	53.72
2	C18-C21	結腸及直腸	5,793	49.98	37.91	42.71
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,756	49.66	35.81	41.54
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,879	42.09	33.29	35.87
5	C61	攝護腺	3,073	26.51	18.4	21.94
6	C16	胃	2,455	21.18	15.14	17.59
7	C15	食道	1,624	14.01	11.06	11.99
8	C67	膀胱	1,406	12.13	8.61	10.05
9	C44 ⁴	皮膚	1,328	11.46	8.4	9.67
10	C11	鼻咽	1,116	9.63	7.62	8.25
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,051	9.07	7.09	7.87
	C00-C80	全癌症	42,017	362.47	276.83	309.7

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十五年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,895	61.10	46.29	49.99
2	C18-C21	結腸及直腸	4,455	39.48	28.33	32.17
3	C22	肝及肝內膽管	2,925	25.92	19.31	21.58
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	2,992	26.51	18.86	21.50
5	C53	子宮頸	1,828	16.20	11.89	13.18
6	C16	胃	1,339	11.87	8.38	9.62

7	C73	甲狀腺	1,257	11.14	8.69	9.45
8	C54	子宮體	1,159	10.27	7.87	8.45
9	C44 ⁴	皮膚	1,129	10.00	6.94	8.11
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	1,000	8.86	6.94	7.47
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	771	6.83	5.31	5.82
	C00-C80	全癌症	31,276	277.15	206.36	228.84

- 註：1. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
2. 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括組織形態代碼M-95903 - M-97293 (M-96503 - M-96673 除外)、M-97503 - M-97583、M-97643，並未列入排名。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率²排序）

十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,594	58.83 (1)	45.54	49.19
2	C22	肝及肝內膽管	9,916	43.55	34.54	37.99
3	C18-C21	結腸及直腸	9,604	42.18	32.11	36.28
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,312	36.50	26.96	31.05
5	C61	攝護腺	2,704	23.39 (2)	16.47	19.72
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,743	20.83	16.47	17.78
7	C53	子宮頸	1,977	17.64 (1)	13.34	14.74
8	C16	胃	3,580	15.72	11.37	13.21
9	C444	皮膚	2,177	9.56	7.12	8.16
10	C54	子宮體	987	8.81 (1)	6.86	7.37
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,690	7.42	5.91	6.53
	C00-C80	全癌症	68,907	302.62	234.21	260.74

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C22	肝及肝內膽管	7,159	61.92	50.52	55.1
2	C18-C21	結腸及直腸	5,497	47.54	37.07	41.77
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,566	48.14	35.94	41.42
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,310	37.28	30.08	32.36
5	C61	攝護腺	2,704	23.39	16.47	19.72
6	C16	胃	2,288	19.79	14.45	16.82
7	C15	食道	1,403	12.13	9.87	10.66
8	C67	膀胱	1,363	11.79	8.74	10.13
9	C44 ⁴	皮膚	1,138	9.84	7.57	8.57
10	C11	鼻咽	1,123	9.71	7.75	8.42
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,005	8.69	7.04	7.76
	C00-C80	全癌症	39,430	341.02	267.67	298.59

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十四年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,594	58.83	45.54	49.19
2	C18-C21	結腸及直腸	4,107	36.64	27.30	30.87
3	C22	肝及肝內膽管	2,757	24.60	18.90	21.16
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	2,746	24.50	18.09	20.64
5	C53	子宮頸	1,977	17.64	13.34	14.74
6	C16	胃	1,292	11.53	8.34	9.59

7	C73	甲狀腺	1,146	10.22	8.17	8.88
8	C44 ⁴	皮膚	1,039	9.27	6.69	7.75
9	C54	子宮體	987	8.81	6.86	7.37
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	894	7.98	6.29	6.81
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	685	6.11	4.79	5.30
	C00-C80	全癌症	29,477	263.00	201.61	223.32

- 註：1. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
2. 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括組織形態代碼M-95903 - M-97293 (M-96503 - M-96673 除外)、M-97503 - M-97583、M-97643，並未列入排名。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率²排序）

十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,176	55.40(1)	43.75	47.29
2	C22	肝及肝內膽管	9,830	43.32	35.33	38.81
3	C18-C21	結腸及直腸	9,535	42.02	32.95	37.16
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	8,142	35.89	27.19	31.35
5	C61	攝護腺	2,660	23.05(2)	16.59	19.82
6	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,783	21.08	17.11	18.44
7	C53	子宮頸	2,292	20.56(1)	15.85	17.53
8	C16	胃	3,718	16.39	12.26	14.20
9	C44 ⁴	皮膚	2,160	9.52	7.24	8.38
10	C67	膀胱	1,904	8.39	6.43	7.36
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,575	6.94	5.62	6.23
	C00-C80	全癌症	67,895	299.24	237.10	264.11

男性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C22	肝及肝內膽管	7,051	61.09	51.12	55.72
2	C18-C21	結腸及直腸	5,426	47.01	37.43	42.21
3	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,537	47.97	36.39	42.12
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,363	37.8	31.27	33.61
5	C61	攝護腺	2,660	23.05	16.59	19.82
6	C16	胃	2,380	20.62	15.53	18.02
7	C15	食道	1,374	11.9	9.91	10.77
8	C67	膀胱	1,380	11.96	9.28	10.59
9	C44 ⁴	皮膚	1,195	10.35	8	9.21
10	C11	鼻咽	1,123	9.73	7.96	8.63
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	893	7.74	6.29	6.98
	C00-C80	全癌症	39,074	338.55	270.96	302.72

女性十大癌症發生率（不含原位癌⁶）（每十萬人口），民國九十三年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	6,176	55.40	43.75	47.29
2	C18-C21	結腸及直腸	4,109	36.86	28.50	32.09
3	C22	肝及肝內膽管	2,779	24.93	19.76	22.05
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	2,605	23.37	17.93	20.35
5	C53	子宮頸	2,292	20.56	15.85	17.53
6	C16	胃	1,338	12.00	8.98	10.32
7	C73	甲狀腺	1,132	10.15	8.14	8.87

8	C44 ⁴	皮膚	965	8.66	6.49	7.54
9	C54	子宮體	877	7.87	6.25	6.76
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	841	7.54	6.09	6.60
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	682	6.12	4.95	5.47
	C00-C80	全癌症	28,821	258.54	203.40	225.14

- 註：1. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
2. 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括組織形態代碼M-95903 - M-97293 (M-96503 - M-96673 除外)、M-97503 - M-97583、M-97643，並未列入排名。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序 (以年齡標準化率²排序)

十大癌症發生率 (不含原位癌⁶) (每十萬人口), 民國九十二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	5,325	48.02 (1)	38.65	42.01
2	C22	肝及肝內膽管	9,404	41.60	34.97	38.33
3	C18-C21	結腸及直腸	8,238	36.44	29.28	33.07
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,415	32.80	25.72	29.52
5	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,435	19.62	16.15	17.50
6	C61	攝護腺	2,237	19.43 (2)	14.27	17.22
7	C53	子宮頸	2,061	18.59 (1)	14.82	16.37
8	C16	胃	3,534	15.63	12.06	13.98
9	C67	膀胱	1,858	8.22	6.47	7.44
10	C44 ⁴	皮膚	1,743	7.71	5.99	6.95
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,593	7.05	5.92	6.52
	C00-C80	全癌症	62,542	276.68	225.01	250.77

男性十大癌症發生率 (不含原位癌⁶) (每十萬人口), 民國九十二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C22	肝及肝內膽管	6,753	58.64	50.45	54.88
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	5,025	43.64	34.29	39.39
3	C18-C21	結腸及直腸	4,677	40.62	33.16	37.29
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	4,040	35.08	29.49	31.81
5	C16	胃	2,308	20.04	15.52	17.98
6	C61	攝護腺	2,237	19.43	14.27	17.22
7	C67	膀胱	1,318	11.45	9.17	10.48
8	C15	食道	1,258	10.92	9.14	10.04
9	C11	鼻咽	1,157	10.05	8.29	9.01
10	C44 ⁴	皮膚	960	8.34	6.65	7.62
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	917	7.96	6.71	7.38
	C00-C80	全癌症	36,285	315.11	259.07	288.98

女性十大癌症發生率 (不含原位癌⁶) (每十萬人口), 民國九十二年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C50	女性乳房	5,325	48.02	38.65	42.01
2	C18-C21	結腸及直腸	3,561	32.11	25.41	28.81
3	C22	肝及肝內膽管	2,651	23.91	19.64	21.87
4	C33-C34	肺、支氣管及氣管	2,390	21.55	17.00	19.35
5	C53	子宮頸	2,061	18.59	14.82	16.37
6	C16	胃	1,226	11.06	8.54	9.86
7	C73	甲狀腺	975	8.79	7.22	7.82
8	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	833	7.51	6.17	6.67

9	C54	子宮體	793	7.15	5.85	6.32
10	C44 ⁴	皮膚	783	7.06	5.35	6.29
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	676	6.10	5.09	5.60
	C00-C80	全癌症	26,257	236.77	190.85	212.02

- 註：1. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
2. 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括組織形態代碼M-95903 - M-97293 (M-96503 - M-96673除外)、M-97503 - M-97583、M-97643，並未列入排名。
6. 原位癌：組織型態之分類碼第5碼(性態譯碼)為2。
7. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序 (以年齡標準化率²排序)

十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十一年

順位	ICD-O-3	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C53	子宮頸	5,725	51.88(1)	41.86	46.22
	C53	子宮頸原位癌	3,618	32.79(1)	26.34	29.01
	C53	子宮頸侵襲癌	2,107	19.09(1)	15.53	17.21
2	C50	女性乳房	5,339	48.38(1)	39.91	43.27
3	C22	肝及肝內膽管	8,860	39.34	33.89	37.16
4	C18-C21	結腸及直腸	7,895	35.06	28.74	32.63
5	C33-C34	肺、支氣管及氣管	7,094	31.50	25.44	29.17
6	C61	攝護腺	2,189	19.06(2)	14.55	17.41
7	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,709	16.47	14.04	15.19
8	C16	胃	3,704	16.45	13.12	15.16
9	C44 ⁴	皮膚	2,171	9.64	7.84	9.02
10	C67	膀胱	1,727	7.67	6.22	7.13
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,448	6.43	5.46	6.02
	C00-C80	全癌症	63,736	283.01	235.99	262.70

男性十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十一年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C22	肝及肝內膽管	6,405	55.77	48.95	53.30
2	C33-C34	肺、支氣管及氣管	4,755	41.40	33.49	38.38
3	C18-C21	結腸及直腸	4,525	39.40	32.77	36.97
4	C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽	3,357	29.23	25.40	27.39
5	C16	胃	2,454	21.37	16.99	19.73
6	C61	攝護腺	2,189	19.06	14.55	17.41
7	C67	膀胱	1,249	10.87	8.87	10.15
8	C44 ⁴	皮膚	1,176	10.24	8.50	9.70
9	C15	食道	1,148	10.00	8.73	9.53
10	C11	鼻咽	1,025	8.92	7.57	8.20
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	821	7.15	6.11	6.75
	C00-C80	全癌症	34,596	301.22	254.14	283.21

女性十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十一年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	C53	子宮頸	5,725	51.88	41.86	46.22
	C53	子宮頸原位癌	3,618	32.79	26.34	29.01
	C53	子宮頸侵襲癌	2,107	19.09	15.53	17.21
2	C50	女性乳房	5,339	48.38	39.91	43.27
3	C18-C21	結腸及直腸	3,370	30.54	24.69	28.22
4	C22	肝及肝內膽管	2,455	22.25	18.88	21.00

5	C33-C34	肺、支氣管及氣管	2,339	21.20	17.18	19.62
6	C16	胃	1,250	11.33	9.15	10.43
7	C44 ⁴	皮膚	995	9.02	7.18	8.33
8	C73	甲狀腺	989	8.96	7.41	8.11
9	C54	子宮體	733	6.64	5.59	6.06
10	C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶	729	6.61	5.53	6.04
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	627	5.68	4.80	5.29
	C00-C80	全癌症	29,140	264.06	217.67	241.69

- 註：1. 2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔、口咽及下咽原發部位代碼包括C00-C06、C09-C10、C12-C14。
 4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
 5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞形態代碼M-95903 - M-97293 (M-96503 - M-96673
 除外)、M-97503 - M-97583、M-97643，並未列入排名。
 6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。
 7. 各原發部位均包括原位癌個案。

十大癌症--按發生率排序 (以年齡標準化率²排序)

十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	5,984	54.58(1)	45.40	49.80
	180	子宮頸原位癌	3,553	32.41(1)	26.72	29.27
	180	子宮頸侵襲癌	2,431	22.17(1)	18.69	20.54
2	174	女性乳房	5,067	46.22(1)	38.60	41.91
3	155	肝及肝內膽管	8,584	38.31	33.83	36.98
4	153-154	結腸及直腸	7,366	32.88	27.85	31.38
5	162	肺、支氣管及氣管	6,781	30.26	25.23	28.90
6	185	攝護腺	2,012	17.58(2)	13.53	16.35
7	140 ³	口腔(含口咽及下咽)	3,591	16.03	13.94	15.07
8	151	胃	3,532	15.76	12.88	14.91
9	173 ⁴	皮膚	1,968	8.78	7.34	8.41
10	188	膀胱	1,807	8.06	6.75	7.77
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,388	6.19	5.46	5.95
	140-199	全癌症	61,606	274.96	235.11	261.13

男性十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	155	肝及肝內膽管	6,193	54.13	48.47	52.62
2	162	肺、支氣管及氣管	4,625	40.42	33.51	38.44
3	153-154	結腸及直腸	4,178	36.52	31.24	35.02
4	140 ³	口腔(含口咽及下咽)	3,230	28.23	24.97	26.89
5	151	胃	2,356	20.59	16.77	19.45
6	185	攝護腺	2,012	17.58	13.53	16.35
7	188	膀胱	1,290	11.27	9.46	10.91
8	150	食道	1,151	10.06	8.92	9.76
9	173 ⁴	皮膚	1,039	9.08	7.67	8.71
10	147	鼻咽	1,004	8.77	7.64	8.26
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	810	7.08	6.28	6.82
	140-199	全癌症	33,157	289.79	249.58	278.02

女性十大癌症發生率(每十萬人口), 民國九十年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	5,984	54.58	45.40	49.80
	180	子宮頸原位癌	3,553	32.41	26.72	29.27
	180	子宮頸侵襲癌	2,431	22.17	18.69	20.54
2	174	女性乳房	5,067	46.22	38.60	41.91
3	153-154	結腸及直腸	3,188	29.08	24.43	27.68
4	155	肝及肝內膽管	2,391	21.81	19.08	21.16

5	162	肺、支氣管及氣管	2,156	19.66	16.59	18.85
6	151	胃	1,176	10.73	8.82	10.15
7	173 ⁴	皮膚	929	8.47	6.98	8.09
8	193	甲狀腺	956	8.72	7.35	7.98
9	183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	741	6.76	5.89	6.28
10	182	子宮體	672	6.13	5.36	5.82
M959 ⁵			578	5.27	4.58	5.02
140-199 全癌症			28,449	259.48	220.13	243.40

- 註：1. 2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，
 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。
3. 口腔（含口咽及下咽）原發部位代碼包括140-141、143-146、148-149。
 4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
 5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞形態代碼M-95903 - M-97043 (M-96503 - M-96673 除外)，並未列入排名。
 6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。
 7. 各原發部位均包括原位癌個案。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率²排序）

十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十九年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	6,276	57.66(1)	49.06	53.81
	180	子宮頸原位癌	3,556	32.67(1)	27.45	30.09
	180	子宮頸侵襲癌	2,720	24.99(1)	21.60	23.73
2	174	女性乳房	4,642	42.65(1)	36.51	39.60
3	155	肝及肝內膽管	8,101	36.37	32.89	36.06
4	153-154	結腸及直腸	7,213	32.38	28.25	31.91
5	162	肺、支氣管及氣管	6,647	29.84	25.46	29.20
6	185	攝護腺	1,888	16.57(2)	13.17	15.83
7	140 ³	口腔（含口咽及下咽）	3,378	15.16	13.51	14.62
8	151	胃	3,339	14.99	12.65	14.60
9	173 ⁴	皮膚	1,729	7.76	6.71	7.66
10	188	膀胱	1,678	7.53	6.45	7.37
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,194	5.36	4.72	5.22
	140-199	全癌症	59,116	265.37	232.06	258.14

男性十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十九年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	155	肝及肝內膽管	5,931	52.06	47.58	51.89
2	162	肺、支氣管及氣管	4,634	40.68	34.33	39.39
3	153-154	結腸及直腸	4,132	36.27	31.88	35.79
4	140 ³	口腔（含口咽及下咽）	3,080	27.04	24.44	26.36
5	151	胃	2,168	19.03	16.07	18.58
6	185	攝護腺	1,888	16.57	13.17	15.83
7	188	膀胱	1,194	10.48	8.93	10.20
8	147	鼻咽	1,027	9.02	7.96	8.60
9	150	食道	971	8.52	7.80	8.51
10	173 ⁴	皮膚	931	8.17	7.07	8.03
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	720	6.32	5.54	6.14
	140-199	全癌症	31,814	279.26	245.39	273.80

女性十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十九年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	6,276	57.66	49.06	53.81
	180	子宮頸原位癌	3,556	32.67	27.45	30.09
	180	子宮頸侵襲癌	2,720	24.99	21.60	23.73
2	174	女性乳房	4,642	42.65	36.51	39.60
3	153-154	結腸及直腸	3,081	28.31	24.52	27.92
4	155	肝及肝內膽管	2,170	19.94	18.04	19.99

5	162	肺、支氣管及氣管	2,013	18.49	16.04	18.31
6	151	胃	1,171	10.76	9.11	10.46
7	193	甲狀腺	875	8.04	6.81	7.43
8	173 ⁴	皮膚	798	7.33	6.29	7.23
9	183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	733	6.73	5.88	6.39
10	182	子宮體	578	5.31	4.71	5.13
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	474	4.35	3.84	4.24
	140-199	全癌症	27,302	250.83	217.96	241.44

註：1. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口。

2. 年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔（含口咽及下咽）原發部位代碼包括140-141、143-146、148-149。

4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞形態代碼M-95903 - M-97043 (M-96503 - M-96673除外)，並未列入排名。

6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

7. 各原發部位均包括原位癌個案。

十大癌症--按發生率排序（以年齡標準化率²排序）

十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十八年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	6,341	58.82(1)	51	55.66
	180	子宮頸原位癌	3,638	33.75(1)	28.78	31.43
	180	子宮頸侵襲癌	2,703	25.08(1)	22.21	24.23
2	174	女性乳房	4,405	40.86(1)	35.73	38.78
3	155	肝及肝內膽管	7,728	34.98	32.23	35.24
4	153-154	結腸及直腸	6,681	30.24	27	30.41
5	162	肺、支氣管及氣管	6,316	28.59	25.09	28.65
6	185	攝護腺	1,777	15.71(2)	12.81	15.42
7	151	胃	3,356	15.19	13.15	15.2
8	140 ³	口腔（含口咽及下咽）	3,176	14.38	13.1	14.17
9	173 ⁴	皮膚	1,680	7.60	6.67	7.69
10	188	膀胱	1,656	7.50	6.51	7.52
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	1,130	5.11	4.64	5.08
	140-199	全癌症	56,323	254.94	227.75	252.8

男性十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十八年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	155	肝及肝內膽管	5,659	50.02	46.14	50.87
2	162	肺、支氣管及氣管	4,368	38.61	33.3	38.15
3	153-154	結腸及直腸	3,871	34.22	30.47	34.24
4	140 ³	口腔（含口咽及下咽）	2,869	25.36	23.45	25.31
5	151	胃	2,230	19.71	16.88	19.62
6	185	攝護腺	1,777	15.71	12.81	15.42
7	188	膀胱	1,209	10.69	9.14	10.57
8	173 ⁴	皮膚	933	8.25	7.27	8.34
9	147	鼻咽	947	8.37	7.47	8.06
10	150	食道	881	7.79	7.15	7.83
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	705	6.23	5.67	6.2
	140-199	全癌症	30189	266.86	238.19	265.95

女性十大癌症發生率(每十萬人口)，民國八十八年

順位	ICD-O- FT	原發部位	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標準 化發生率 ¹	年齡標準 化發生率 ²
1	180	子宮頸	6,341	58.82	51	55.66
	180	子宮頸原位癌	3,638	33.75	28.78	31.43
	180	子宮頸侵襲癌	2,703	25.08	22.21	24.23
2	174	女性乳房	4,405	40.86	35.73	38.78
3	153-154	結腸及直腸	2,810	26.07	23.36	26.37
4	155	肝及肝內膽管	2,070	19.2	17.92	19.74

5	162	肺、支氣管及氣管	1,947	18.06	16.16	18.31
6	151	胃	1,126	10.45	9.17	10.49
7	193	甲狀腺	913	8.47	7.24	7.89
8	173 ⁴	皮膚	747	6.93	6.06	7.03
9	183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	654	6.07	5.43	5.84
10	182	子宮體	509	4.72	4.34	4.67
	M959 ⁵	非何杰金氏淋巴瘤	426	3.95	3.58	3.92
	140-199	全癌症	26,134	242.44	215.96	238.01

註：1. 2. 年齡標準化率¹係使用1976年世界標準人口為標準人口，年齡標準化率²係使用2000年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔（含口咽及下咽）原發部位代碼包括140-141、143-146、148-149。

4. 皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。

5. 非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞形態代碼M-95903 - M-97043 (M-96503 - M-96673除外)，並未列入排名。

6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

7. 各原發部位均包括原位癌個案。

十大癌症--按發生率排序
十大癌症發生率，民國八十七年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	180	子宮頸	5,891	55.41(1)	49.32
2	174	女性乳房	3,712	34.91(1)	31.48
3	155	肝及肝內膽管	7,124	32.63	31.04
4	153-154	結腸及直腸	6,298	28.84	26.57
5	162	肺、氣管及支氣管	5,838	26.74	24.4
6	151	胃	3,313	15.17	13.75
7	185	攝護腺	1,597	14.25(2)	11.92
8	140 ²	口腔	2,731	12.51	11.7
9	173 ³	皮膚	1,637	7.50	6.82
10	188	膀胱	1,495	6.85	6.2
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	1134	5.19	4.87

男性十大癌症發生率，民國八十七年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	155	肝及肝內膽管	5,315	47.44	45.24
2	162	肺、氣管及支氣管	4,088	36.49	32.48
3	153-154	結腸及直腸	3,572	31.88	29.08
4	140 ²	口腔	2,473	22.07	20.9
5	151	胃	2,190	19.55	17.5
6	185	攝護腺	1,597	14.25	11.92
7	188	膀胱	1,097	9.79	8.76
8	147	鼻咽	972	8.68	8.02
9	150	食道	841	7.51	7.03
10	173 ³	皮膚	846	7.55	6.81
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	663	5.92	5.52

女性十大癌症發生率，民國八十七年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	180	子宮頸	5,891	55.41	49.32
2	174	乳房	3,712	34.91	31.48
3	153-154	結腸及直腸	2,726	25.64	23.83
4	155	肝及肝內膽管	1,809	17.01	16.33
5	162	肺、氣管及支氣管	1,750	16.46	15.48
6	151	胃	1,123	10.56	9.67
7	173 ³	皮膚	791	7.44	6.82
8	193	甲狀腺	811	7.63	6.7
9	183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	626	5.89	5.44
10	182	子宮體	511	4.81	4.57
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	471	4.43	4.16

- 註：1.各原發部位均包括原位癌個案。
- 2.口腔原發部位代碼包括140-141、143-146、148-149。
- 3.皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
- 4.非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞型態代碼M-95903 - M-97043 (M96503 - M-96673除外)，並未列入排名。
- 5.臺灣十大癌症發生率順位係以年齡標準化率排序。
6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。

十大癌症--按發生率排序
十大癌症發生率，民國八十六年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	180	子宮頸	4,984	47.38(1)	42.84
2	174	女性乳房	3,478	33.06(1)	30.45
3	155	肝及肝內膽管	6,174	28.54	27.71
4	153-154	結腸、直腸	5,472	25.29	23.85
5	162	肺、氣管及支氣管	5,286	24.43	22.8
6	151	胃	3,217	14.87	13.7
7	185	攝護腺	1,374	12.36(2)	10.7
8	140 ²	口腔	2,405	11.12	10.66
9	173 ³	皮膚	1,437	6.64	6.16
10	188	膀胱	1,388	6.42	6.03
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	987	4.56	4.33

男性十大癌症發生率，民國八十六年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	155	肝及肝內膽管	4,594	41.33	39.9
2	162	肺、氣管及支氣管	3,729	33.55	30.56
3	153-154	結腸、直腸	3,130	28.16	26.09
4	140 ²	口腔	2,144	19.29	18.62
5	151	胃	2,070	18.62	16.81
6	185	攝護腺	1,374	12.36	10.7
7	188	膀胱	978	8.8	8.06
8	147	鼻咽	932	8.39	7.9
9	150	食道	792	7.13	6.86
10	173 ³	皮膚	767	6.9	6.28
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	574	5.16	4.83

女性十大癌症發生率，民國八十六年

順位	ICD-O- FT	原發部位 ¹	個案數 (人)	粗發生 率	年齡標 準化發
1	180	子宮頸	4,984	47.38	42.84
2	174	乳房	3,478	33.06	30.45
3	153-154	結腸、直腸	2,342	22.26	21.37
4	155	肝及肝內膽管	1,580	15.02	14.9
5	162	肺、氣管及支氣管	1,557	14.8	14.17
6	151	胃	1,147	10.9	10.24
7	173 ³	皮膚	670	6.37	6.01
8	193	甲狀腺	692	6.58	5.87
9	183	卵巢、輸卵管及寬韌帶	584	5.55	5.23
10	182	子宮體	449	4.27	4.14
	M959 ⁴	非何杰金氏淋巴瘤	413	3.93	3.77

- 註：1.各原發部位均包括原位癌個案。
- 2.口腔原發部位代碼包括140-141、143-146、148-149。
- 3.皮膚原發部位包括基底細胞癌個案。
- 4.非何杰金氏淋巴瘤，包括細胞型態代碼前三碼M959-970 (EXCEPT M965-966)，並未列入排名。
- 5.臺灣十大癌症發生率順位係以年齡標準化率排序。
6. (1)每10萬女性人口粗發生率；(2)每10萬男性人口粗發生率。